



DetECCIÓN TEMPRANA ¿Cuándo es necesario derivar o consultar?

Los factores de riesgo presentes en niños y niñas entre los 2 y 5 años, nos permitirán explicar a la familia la necesidad de una derivación temprana a una fonoaudióloga especialista en Tartamudez, para entregar sugerencias e iniciar una intervención ajustada a las necesidades de cada caso.

Factores de riesgo de Tartamudez persistente

Es de sexo masculino
Existen antecedentes familiares de tartamudez
Ha presentado disfluencias por más de 6 meses
Parece haber empeorado su tartamudez con el tiempo
Se presenta un retraso o trastorno del lenguaje o habla
Se observa un temperamento sensible en el(la) niño(a)

Repetición de palabras monosilábicas

(Ej. "yo yo yo yo yo yo sé jugar")

Repetición de sílabas iniciales de palabras

(Ej. "quiero chochochochocolate")

Repeticiones de sonidos

(Ej. "¿tttttttienes mi pelota?")

Prolongaciones de sonidos

(Ej. "m___añana voy al colegio")

Bloqueos (Ej. "me llamo /Cata")

Signos presentes en el habla y la comunicación

Tensión física al hablar (contractura de músculos de cara, cuello y/o movimientos asociados)
Evitación de situaciones comunicativas (Ej. Susurrar al oído, evitar responder preguntas, callarse al aparecer una traba, entre otras)

Cuando encontramos uno o más de los signos aquí señalados, a cualquier edad, es recomendable la evaluación de la fluidez del habla, por parte de una especialista.

www.fluirmas.com